



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  
شهید بهشتی

# راهنمای درمان آنتی بیوتیکی و مایع درمانی خوراکی در بیماری وبا

تهیه کننده :

دکتر محمدرضا سربازی

کارشناس مسئول بیماریهای واگیر دانشگاه

گروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با بیماریها

معاونت امور بهداشتی

تابستان ۱۳۸۷

## جدول مایع درمانی خوراکی:

بیماران بدون دهیدراتاسیون :

سن	مقدار محلول تجویزی پس از هر بار اسهال	تعداد پاکت او.آر.اس
کمتر از ۲۴ ماه	۵۰-۱۰۰ میلی لیتر	به اندازه ۵۰۰ میلی لیتر در روز
۲ تا ۹ سال	۱۰۰-۲۰۰ میلی لیتر	به اندازه ۱۰۰۰ میلی لیتر در روز
۱۰ سال به بالا	هر چقدر میل دارد	به اندازه ۲۰۰۰ میلی لیتر در روز

دهیدراتاسیون نسبی تجویز در ۴ ساعت اول :

سن	کمتر از ۴ ماه	۴-۱۱ ماه	۱۲-۲۳ ماه	۲-۴ سال	۵-۱۴ سال	بیشتر از ۱۵ سال
وزن به کیلوگرم	کمتر از ۵	۵-۷/۹	۸-۱۰/۹	۱۱-۱۵/۹	۱۶-۲۹/۹	بیشتر از ۳۰
مقدار ORS به میلی لیتر	۲۰۰-۴۰۰	۴۰۰-۶۰۰	۶۰۰-۸۰۰	۱۲۰۰-۸۰۰	۲۲۰۰-۱۲۰۰	۲۲۰۰-۴۰۰۰

## جدول جایگزینی مایعات داخل وریدی:

سن	ابتدا 30ml/kg در عرض ..... تجویز کنید	سپس 70 ml/kg در عرض ..... تجویز کنید
کمتر از ۱۲ ماه	۱ ساعت*	۵ ساعت
یکسال یا بزرگتر	۳۰ دقیقه*	۲/۵ ساعت

\* در صورتی که پس از تجویز 30ml/kg مایعات وریدی؛ نبض رادیال ضعیف بود؛ یک مرتبه دیگر آن را تکرار کنید.

آنتی بیوتیک مناسب در بزرگسالان داکسی سیکلین (بصورت تک دوز 300mg) یا تتراسیکلین (۴ بار در روز به مدت ۳ روز) با دوز ۱۲/۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در کودکان و ۵۰۰ میلی گرم در بزرگسالان می باشد.

- در خانمهای حامله و کودکان کمتر از ۸ سال داروی انتخابی اریترومايسين و آمپی سیلین می باشد. (براساس آنی بیوگرام مورخ ۸۷/۵/۶ آزمایشگاه رفرانس کشوری؛ همچنین مقاومت به فورازولیدون و کوتریمکسازول ۸۰٪ گزارش شده است)

- دوز اریترومايسين در بزرگسالان ۲۵۰ میلی گرم ۴ بار در روز به مدت ۳ روز  
- دوز اریترومايسين در کودکان ۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ۳ بار در روز به مدت ۳ روز