

- تا آنجا که ممکن است، خودتان برای دریافت داروهای شخصی به داروخانه مراجعه کنید. در غیر این صورت کسی را بفرستید که کاملاً از شرایط شما آگاه است و در جریان روند درمان قرار دارد. به این ترتیب به داروساز خود امکان می‌دهید تا اطلاعات لازم برای تحلیل وضعیت بیماری شما را به دست آورد و متقابلاً اطلاعات و راهنماییهای لازم را در اختیارتان بگذارد .
- همیشه نام دارو یا داروهای را که مصرف می‌کنید همراه با میزان مصرف، زمان مصرف و یا هرگونه دستور خاص مصرف آنها به صورت نوشته، داشته باشید. یادتان باشد که بروز هرگونه مشکل احتمالی با آن دارو را در مقابل نام آن ذکر کنید تا بتوانید مساله را با پزشک معالج یا داروساز خود در میان بگذارید .
- بر چسب راهنمای مصرف دارو را در نور کافی مطالعه کنید .
- درباره امکان جویدن یا خرد کردن قرصها، حتماً با پزشک یا داروساز مشورت کنید . بسیاری از قرصها را نباید جوید یا تقسیم کرد .
- هرگز (حتی پس از رفع علائم بیماری) به طر خودسرانه و بدون مشاوره با پزشک، مصرف دارو را قبل از مدت توصیه شده توسط طبیب، قطع نکنید .
- اگر با هر علامت یا عارضه جدید مواجه شدید، فوراً پزشک یا داروساز خود را مطلع کنید .
- تمدید نسخ پزشکی تنها با تایید پزشک امکان پذیر است. هرگز از داروخانه خودسرانه تقاضای تمدید نسخ دارویی را نکنید .
- پیش از آنکه داروی بدون نسخه‌ای را برای نخستین بار مصرف کنید، حتماً با داروساز یا پزشک خود صحبت کنید (بخصوص اگر به طور همزمان از داروی دیگری نیز استفاده می‌کنید).
- تا آنجا که ممکن است از تعویض بسته‌بندی دارو خودداری کنید. اگر می‌خواهید دارو را در ظرفی بجز ظرف اولیه آن نگهداری کنید، حتماً با داروساز خود مشاوره کنید (بسیاری از داروها برای آنکه اثر خود را از دست ندهند، باید در شرایط یا ظروف خاص خود نگهداری شوند).

- دارو را در مکانهای مرطوب، گرم و زیر نور شدید نگهداری نکنید (مگر آنکه در این مورد نکته خاصی روی بسته‌بندی دارو ذکر شده باشد) .
- هرگز دارو را در نزدیکی مواد خطرناک نگهداری نکنید، زیرا امکان مصرف اشتباه وجود دارد .
- هرگز خودسرانه از داروی تجویز شده برای دیگران استفاده نکنید و مصرف داروهای تجویز شده برای بیماری خود را به دیگران توصیه ننمایید .
- هرگز (بخصوص در مورد بچه ها) داروها را به منظوری غیر از آنچه توسط پزشک توصیه شده است، مصرف نکنید .
- پیش از دادن ترکیبات حاوی آسپیرین به بچه ها حتماً با پزشک مشورت کنید. هرگز به کودک یا نوجوانی که در حال بهبودی از بیماری آبله مرغان، علائم زکام (تهوع، استفراغ یا تب) یا بیماری زکام می‌باشد، داروی آسپیرین ندهید. این دارو ممکن است در بچه ها سبب بروز عارضه نادر و خطرناکی به نام سندرم یا نشانگان ری گردد .
- دارو را پیش از مصرف کاملاً بررسی کنید. هرگز در صورت تغییر رنگ، بوی نامعمول و یا هر گونه علامت مشکوک دیگر از دارو استفاده نکنید .